ROXID®
nifuroxazide

PRESENTATION :

Gélules dosées à 200 mg - Boite de 16 et 28. Suspension buvable à 4,4g pour 100 - Flacon de 90 ml.

Propriété: Le Nifuroxazide, principe actif de ROXID®, est un puissant antiseptique intestinal, actif vis-à-vis de nombreux germes entéropathogènes. ROXID® n'est pas absorbé au niveau intestinal et exerce une activité de contact sans aucune diffusion systémique.

Indications:

- Diarrhées aiguës présumées d'origine bactérienne en l'absence de suspicion de phénomènes invasifs.
- Entérites et colites d'origine infectieuse - Dysentéries de toutes origines
- Toxi-infections alimentaires. En cas de nécessité, le traitement ne dispense pas d'une réhydratation.

Contre-indications: - Tout antécédent de réaction allergique aux dérivés du nitrofurane. - Nouveaux-nés de 0 à 1 mois.

Précautions d'emploi:

En cas de diarrhées sanglantes ou purulentes, consulter le médecin traitant. Eviter ROXID® chez les sujets présentant un déficit congénital en saccharose.

Mode d'emploi et posologie: Selon prescription médicale. - Le traitement ne doit pas dépasser 7 jours. Au-delà, la conduite à tenir doit être réévaluée. Les doses doivent être fractionnées en plusieurs prises réparties dans la journée. - Adultes: 4 gélules à 200 mg par jour en 4 prises - Enfants: 2 à 3 gélules à 200 mg par jour – Jeunes enfants : 3 cuillerées à café par jour en 2 ou 3 prises - Nourrissons de 1 à 30 mois: 220 mg à 660 mg par jour en 2 ou 3 prises soit 1 à 3 cuillerées à café selon l'âge. La suspension doit être bien agitée avant l'emploi. Une cuillerée à café contient 220 mg de Nifuroxazide.